

COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA CON VERDE DE INDOCIANINA.

La combinación de verde de indocianina y colecistectomía laparoscópica es una técnica que se ha ido incorporando en algunos procedimientos quirúrgicos para mejorar la visualización de las estructuras biliares.

Verde de indocianina es un colorante que se utiliza en medicina para diversos propósitos, incluyendo la identificación de estructuras anatómicas durante la cirugía. En el caso de la colecistectomía laparoscópica, se inyecta esta sustancia intravenosamente antes de la intervención. El verde de indocianina se acumula en el hígado y se excreta en la bilis, lo que permite resaltar los conductos biliares durante la cirugía.

Esto puede ayudar a:

1. Identificar el conducto cístico: Facilita el reconocimiento del conducto que conecta la vesícula biliar con el conducto biliar principal, minimizando el riesgo de lesiones.
2. Mejorar la visualización: Proporciona un contraste que puede hacer más fácil distinguir entre la vesícula biliar y los tejidos circundantes.
3. Evitar complicaciones: Ayuda a mitigar el riesgo de lesiones biliares, que es una de las complicaciones más temidas en la colecistectomía laparoscópica.

Es importante mencionar que la técnica y el uso del verde de indocianina pueden no estar disponibles en todos los hospitales o clínicas y se utilizan más en escenarios en los que se anticipan casos complicados.